CLARO 375 SC

Fungicid cu acţiune sistemică, pentru utilizare ca prevenţie, intervenţie şi tratament împotriva bolilor cauzate de ciuperci, la culturile de rapiţă, grâu, triticale, orz, floarea soarelui, mac şi muştar

Certificat de omologare nr: 898PC/17.12.2023
Conținut în substanță activă:
azoxistrobină (CAS no. 131860-33-8) – 200 g/L (17,83% g/g)
protioconazol(CAS no.178928-70-6)- 175 g/L(15,61% g/g)

UFI: N6TP-CN6W-FM7S-DKHG
Formulare: Suspensie concentrată (SC)
Categorie de utilizatori: Profesionişti
Producător/ Deținătorul omologării:
Innvigo Sp.z.o.o.
Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Varșovia, Polonia
Importator:
Innvigo Agro SRL
Cluj-Napoca, Str. Barbu Stefanescu Delavrancea,
Nr. 8-10, Jud Cluj
Tel: 0374.912.123.
Email: office.ro@innvigo.com, www.ro.innvigo.com



Atenţie

H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH401	Cu scopul de evitare a pericolelor pentru sănătate și mediu, trebuie să urmați instrucțiunea de utilizare.
EUH208	Conține 1,2-benzizotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.
P261	Evitați inhalarea spray-ului.
P280	Purtaţi mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței
P273	Evitati dispersia in mediu.
P304 + P340	ÎN CAZ DE INHALARE: scoateți sau transportați victima la aer curat și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P305 + P351 + P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Clatiti gura.
P391	Colectați scurgerile de produs.
P501	Eliminati continutul/recipientul la o instalatie de eliminare a deseurilor periculoase

SP1 A nu se contamina apa cu produsul său cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentul de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15 m până la apele de suprafață.



“Eliminarea ambalajelor goale: Dupa golire ambalajele se clatesc de trei ori, iar apa rezultata se adauga la solutia de stropit. Ambalajele de plastic inscriptionate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonati la 0800.800.211- numar gratuit sau consultati www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare si al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolositi ambalajele goale in alte scopuri.”

TERMEN DE VALABILITATE : 2 ANI de la data inscrisa pe ambalaj
Ambalaj: material/capacitate
HDPE: 250ml; 500ml; 510ml; 564ml; 600ml; 800ml; 1000ml;1200ml; 3000ml; 2000ml; 4000 ml; 5000 ml; 5850 ml; 6000ml;
HDPE/PA: 275ml; 323 ml; 500 ml; 550 ml; 574 ml;1000ml;1100ml; 5000ml;5500 ml;10000 ml.
HDPE/F: 5950 ml HDPE/F bottles
HDPE/EVOH: 0.5L; 1L; 5L; 10L; 20L.

A se utiliza numai pentru scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucţiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor şi a mediului înconjurător pot fi evitate numai dacă se vor respecta recomandările din prezenta etichetă. Citiţi întotdeauna eticheta înainte de utilizare.

PROPRIETĂTI FIZICO-CHIMICE
FUNGICID sub formă de suspensie concentrată, omogenă, de culoare alb-crem, cu miros caracteristic.
DESCRIEREA MODULUI DE ACȚIUNE:
Claro 375 SC este un fungicid cu acțiune sistemică, utilizat pentru tratamentul preventiv al bolilor cauzate de ciupercile fitopatogene. Produsul conţie 2 substanţe active cu mecanisme diferite de acţiune: protioconazol- substanţa activă din grupa triazolilor, acţionează prin inhibarea biosintezei sterolilor-inhibitori de demetilare(SBI-DMI) , aparţine grupei FRAC 3 şi azoxistrobina substanţa activă din grupa strobilurinelor, care acţionează la nivelul mitocondriei fungice, unde se leagă de complexul citocrom bc1 şi inhibă respiraţia celulară și producerea de energie prin fosforilare oxidativă; este inhibitor al citocromului bc1- QoI, şi aparţine grupei FRAC 11.

APLICAREA PRODUSULUI
Produsul este destinat utilizării cu echipamente de puverizare terestre. Tehnica de stropire recomandată: picături medii
In România produsul CLARO 375SC este omologat la următoarele culturi:

CULTURA	**Agentul patogen**	**Doza (L/ha)**	**Nr max de tratamente**
Floarea soarelui	*Alternariaster helianthi / Alternaria helianthicola(alternarioza)* *Sclerotinia sclerotiorum(putregaiul alb)* *Plenodomus lindquistii(pătarea neagră)* *Botrytis cinerea(putregaiul cenusiu)*	**1L/ha** BBCH 16-65	**1**
		0,9 L/ha BBCH 16-53 BBCH 53-67	**2** Interval între tratamente min. **21 zile**
Rapiţa de toamnă	*Sclerotinia sclerotiorum* (putregaiul alb), *Verticillium long-isporum*(verticilioza rapiţei)	1 L/ha BBCH 59-65	1
	Alternaria brassicae (alternarioza)	1 L/ha BBCH 65-69	1

Grâu de toamnă	*Oculimacula yallundae*(pătarea in ochi a bazei tulpinii, frângerea tulpinii), *Rhizoctonia cerealis(*putrezirea rădacinilor-rizoctonia*), Fusarium spp.(*fuzarioza)	1 L/ha BBCH 25-32	1
	Blumeria graminis(făinarea cerealelor)	1 L/ha BBCH 31-59	1
		1 L/ha BBCH 31-39; BBCH 49-59	2
	Pyrenophora tritici repentis(pătarea reticulară a frunzelor de grâu); Puccinia recondita (rugina brună a grâului); *Puccinia striiformis*(rugina galbenă);	1 L/ha BBCH 39-49	1
	Mycosphaerella graminicola/ Septoria tritici (pătarea frunzelor);	1 L/ha BBCH 39-49	1
		1 L/ha BBCH 31-59;	2
	Septoria nodorum/Phaeosphaeria nodorum(septorioza spicelor de grâu); *Fusarium culmorum (*fuzarioză spicelor)	1 L/ha BBCH 61-69	1
Triticale de toamnă	*Blumeria graminis*(făinarea cerealelor)	1 L/ha BBCH 30-59	1
		1 L/ha BBCH 31-59	2
	*Fusarium spp.(*fuzarioza spicelor) *Rhizoctonia cerealis*(putrezirea rădacinilor-rizoctonia)	BBCH 25-32	1
	Pyrenophora tritici repentis(pătarea reticulară a frunzelor de grâu); Puccinia recondita (rugina brună a grâului); *Puccinia striiformis*(rugina galbenă);	BBCH 39-49	1
	Rhynchosprium secalis(arsura frunzelor de orz)	BBCH 30-59	1
	Mycosphaerella graminicola/Septoria tritici (pătarea frunzelor);	1 L/ha BBCH 30-59	1
		1 L/ha BBCH 31-59;	2
	Septoria nodorum/Phaeosphaeria nodorum(septorioza spicelor de grâu); *Fusarium culmorum (*fuzarioză)	1 L/ha BBCH 61-69	1

Orz de primăvară	*Erysiphe graminis*(făinarea); *Pyrenophora teres (*Pătarea frunzelor de cereale) *Rhynchosporium secalis,* (Pătarea reticulară orzului) *Puccinia hordei*(Rugina orzului)	1 L/ha BBCH 29-59;	2
	Fusarium culmorum(fuzarioză)	1 L/ha BBCH 49-51	1
Secară de primavară	*Oculimacula yallundae*(pătarea in ochi a bazei tulpinii), *Fusarium spp.(fuzarioza spicelor)*, *Blumeria graminis(făinarea cerealelor) Rhynchosporium secalis,* (Pătarea reticulară a orzului); *Pyrenophora tritici repentis(pătarea reticulară a frunzelor de grâu); Puccinia recondita (rugina brună a grâului); Puccinia striiformis(rugina galbenă) Septoria nodorum/Phaeosphaeria nodorum(septorioza spicelor de grâu); Fusarium culmorum (fuzarioză)*	1 L/ha BBCH 25-69	2
Mac	*Sclerotinia sclerotiorum*(putregaiul alb) *Botrytis cinerea*(putregaiul cenuşiu)	1 L/ha BBCH 59-69,	1
Muştar	*Sclerotinia sclerotiorum*(putregaiul alb), *Alternaria brassicicola(* alternariozã*), Leptosphaeria maculans(verticili)*	1 L/ha BBCH 59-69,	1

Rapiţa de toamnă

Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb), Verticillium long-isporum(verticiloza rapiţei):

Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha

Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome de boală, de la aparitia primelor petale vizibile, faza de buton galben până la inflorite completă 50% din flori deschise pe racemul principal iar etalele mai vechi căzute(BBCH 59-65).

Alternaria brassicae (alternarioza)

Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha

Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome de boală, de la faza de înflorite completă 50% din flori deschise pe racemul principal iar petalele mai vechi căzute până la sfârşitul înfloririi(BBCH 65-69).

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetație: 1

Cantitatea recomandată de apă: 200-300 L/ha

Floarea soarelui
Alternarioza, putregaiul alb, pătarea neagră, putregaiul cenusiu

O singura aplicare pe sezon:
Doza maximă/recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha
Perioada de utilizare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor simptome de boală, de la a şasea frunză până la mijlocul fazei de înflorire (BBCH 16-65).

Cantitatea recomandată de apă: 150-600 L/ha
Tehnica de stropire recomandată: picături medii.
Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 1

Doua aplicari pe sezon
Doza maximă recomandată pentru o singură administrare: 0,9 L/ha
Perioada de utilizare: produsul trebuie utilizat imediat după observarea primelor simptome de boală, primul tratament de la a sasea frunză până la aparitia inflorescentei (BBCH 16-53) iar al doilea tratament de la faza de inflorescenţă până la sfarşitul înfloririi(BBCH 53-67).

Cantitatea recomandată de apă: 150-600 L/ha
Tehnica de stropire recomandată: picături medii.
Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 1

La cereale, produsul se poate utiliza în 2 scheme de aplicare în perioada unui sezon vegetativ astfel:

<u>Schema 1 – o singură aplicare pe sezon</u>
Grâu de toamnă
Fuzarioza, putregaiul bazei tulpinii şi rădăcinilor(nivel mediu de eficacitate)*, pătarea in ochi a bazei tulpinii, rizoctonia cerealelor:*
Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome ale bolilor, primăvara, de la faza de infrătire -5 fraţi vizibili, până la faza celui de al doilea internod (BBCH 25-32). Pentru controlul *frângerii paiului* se recomandă efectuarea tratamentului de la începutul alungirii paiului, BBCH 30.
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Făinarea cerealelor(nivel mediu de combatere)
Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor semne de boală, primăvara, de la începutul alungirii tulpinii până la sfârşitul înspicării(BBCH 32-59).
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Pătarea brună a frunzelor, rugina brună , rugina galbenă a cerealelor, septorioza frunzelor de grâu(nivel mediu de eficacitate).
Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor semne de boală, de la apariţia frunzei stindard până la apariţia spicului (BBCH 39-49).
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha

Septorioza spicelor , fuzarioza spicelor
Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor semne de boală, de la începutul până la sfârşitul fazei de înflorire(BBCH 61-69).

Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Triticale de toamnă
Fuzarioza bazei tulpinii şi radacinilor(nivel mediu de combatere), rizoctonia cerealelor:
Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome ale bolilor, primăvara, de la faza de infrăţire- 5 fraţi vizibili, până la faza celui de al doilea internod (BBCH 25-32).
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Făinarea cerealelor, rincosporioza frunzelor:
Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome ale bolilor, primăvara, de la începutul alungirii tulpinii până la sfârşitul înspicării(BBCH 30-59).
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Pătarea brună, rugina brună, rugina galbenă a cerealelor, septorioza frunzelor
Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome ale bolilor, de la apariţia frunzei stindard până la apariţia spicului (BBCH 39-49). Pentru combaterea septoriozei tratamentul trebuie efectuat până la sfârşitul înspicării(BBCH 59)
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Septorioza spicelor, fuzarioza spicelor
Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor semne de boală, de la începutul până la sfârşitul fazei de înflorire(BBCH 61-69).
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Orz de primăvară
fuzarioze
Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome de boală, de la faza primelor spiculeţe vizibile până la începutul fazei de înspicare -vârful inflorescenţei a iesit din teacă, spicula superioară este abia vizibilă (BBCH 49-51).
Cantitatea recomandată de apă: 200-300 L/ha
Tehnica de stropire recomandată: picături medii

<u>Schema 2 – două aplicări pe sezon</u>

Grâu de toamnă
Septorioza frunzelor de grâu(nivel mediu de combatere), fainarea cerealelor
Doza maximă/doza recomandată pe aplicare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome ale bolii, de la faza primului nod până la sfârşitul inspicării(BBCH 31-59).
Intervalul dintre tratamente : 21 zile
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Triticale de toamnă
Făinarea cerealelor, septorioza frunzelor
Doza maximă/doza recomandată pe aplicare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome ale bolii, de la faza primului nod până la sfârşitul inspicării(BBCH 31-59).

Intervalul dintre tratamente : 21 zile
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Orz de primăvară
Făinarea cerealelor, pătarea reticulară a frunzelor de orz, rugina orzului, rincosporioza cerealelor
Doza maximă/doza recomandată pe aplicare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome ale bolii, de la sfârşitul înfrăţirii-numărul maxim de fraţi vizibili, până la sfârşitul fazei de înspicare(BBCH 29-59).
Intervalul dintre tratamente : 21 zile
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Omologarea următoarelor utilizări s-a realizat fără prezentarea studiilor de eficacitate ale produsului. Pentru aceste utilizări, deținătorul omologării nu poartă răspunderea pentru eventuale eșecuri în ceea ce priveşte eficacitatea sau fitotoxicitatea rezultate din utilizarea produsului.

Secară de primăvară
fuzarioză putregaiul bazei tulpini, frangerea tulpinii cerealelor și gramineelor, făinarea cerealelor și gramineelor, pătarea brună a frunzelor, rugina brună a secarei, rugina galbenă a cerealelor și gramineelor, rincosporioza cerealelor, fuzarioza spicelor, septorioza spicelor
Doza maximă/recomandată pentru o singură administrare: 1,0 l/ha
Perioada de utilizare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome de boală, de la faza primilor cinci fraţi vizibi până la faza totală înflorire (BBCH 25-69). Pentru combaterea frângerii tulpinii și a fuzariozei/putregaiul tulpinii, tratamentul se efectuează până faza celui de-al doilea internod (BBCH 32). Pentru combaterea fuzariozei septoriozei spicelor se aplică din faza de înflorire(BBCH 51).
Numărul de tratamente: 2
Intervalul dintre tratamente: cel puțin 14 zile.

Mac
Putregaiul cenusiu, putregaiul alb
Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome ale bolii, de la începutul infloririi , până la sfârşitul înfloririi(BBCH 59-69).
Numărul de tratamente : 1
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Muştar
Alternarioza cruciferelor, putregaiul alb, putregaiul cenuşiu
Doza maximă/doza recomandată pentru o singură administrare: 1,0 L/ha.
Perioada de aplicare: produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după apariția primelor simptome ale bolii, de la faza de buton galben , până la sfârşitul fazei de înflorire(BBCH 59-69).
Numărul de tratamente : 1
Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.

Rotaţia culturilor
Produsul nu prezintă niciun risc pentru plantele cultivate în ciclul normal de rotaţie.
In cazul necesităţii desfiinţarii timpurii a culturii tratate cu produs, nu există restricţii pentru culturile ce pot fi semănate ulterior, dar se recomanda o arătură la 25 cm adâncime înainte de semănat.

MĂSURI DE PRECAUȚIE, TIMP DE PAUZĂ ȘI CONDIȚII SPECIALE DE UTILIZARE
Perioada de la ultima aplicare a produsului până la data recoltării culturii (timp de pauză):
Grâu de toamnă, triticale de toamnă, orz de primăvară, secară de primăvară : 35 zile, floarea soarelui, rapiță de toamnă, muştar, mac: 56 zile.

1. Produsul trebuie utilizat la temperaturi ale aerului de peste 12^0C.
2. Produsul conţine 2 substanţe active din clase diferite, cu mod de acţiune diferit.
   Ca parte a strategiei anti-rezistență şi pentru prevenirea dezvoltării imunităţii în populaţiile promotorilor bolilor , se recomandă:
   - utilizarea produsului în principal la tratamentele preventive (profilactice),
   - utilizați produsul în dozele recomandate pe etichetă,
   - utilizați produsul alternativ cu produse care conțin substanțe active din alte grupe chimice, cu mecanism de acțiune diferit(utilizare alternativă),
   - utilizarea metodelor nechimice de protecţie împotriva bolilor, în conformitate cu principiile protecţiei integrate a fungicidelor.

PREGĂTIREA SOLUŢIEI PENTRU STROPIRE
Agitați înainte de utilizare. Solutia de stropire se va pregăti doar înainte de utilizare.
Înainte de prepararea soluției de stropit stabiliți exact volumul de apă şi cantitatea de produs necesare. La umplerea rezervorului echipamentrului procedați în conformitate cu instrucțiunile producătorului mașinii de stropit. În cazul lipsei instrucțiunilor, cantitatea măsurată de produs trebuie adăugată în rezervorul mașinii de stropit umplut parțial cu apă (cu agitatorul pornit).
Ambalajul golit, trebuie clătit de trei ori cu apă iar apa de la clătire adăugată la soluţia de stropit din rezervorul mașinii de stropit iar apoi se completează cu cantitatea necesară de apă sub continua agitare a solutiei din rezervor. Dacă rezervorul mașinii de stropit nu este echipat cu un agitator hidraulic, trebuie să amestecați mecanic lichidul din rezervor. În cazul întreruperilor de stropire, înainte de reluarea lucrului, soluţia din rezervor trebuie bine omogenizată.

GESTIONAREA DESEURILOR ȘI SPĂLAREA ECHIPAMENTELOR
Resturile de soluţie de stropire sau produs rămase neutilizate vor fi:
- utilizate pe suprafața pe care a fost efectuat tratamentul, după o diluare prealabilă, dacă acest lucru este posibil, sau
- eliminate folosind o soluție tehnică pentru a asigura degradarea biologică a substanțelor active din produsele fitosanitare, sau
- eliminate în alt mod, în conformitate cu prevederile privind deșeurile.

Imediat după utilizare echipamentrul de stropire se spală și se clăteşte bine cu apă de cel puţin două ori.

MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU UTILIZATORII PRODUSULUI, LUCRĂTORI DE CÂMP ȘI TERȚI

Înainte de utilizarea produsului trebuie informate despre acest fapt toate părțile interesate care pot fi expuse la aplicarea soluției de stropire și care au solicitat o asemenea informație.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.
Purtați mănuși de protecție, protecţie pentru ochi sau faţă și îmbrăcăminte de lucru(salopete) în timpul preparării soluției și în timpul tratamentului. Utilizați mănuși de protecție și îmbrăcăminte de lucru când intrați în zona tratată (angajat).
În timpul tratamentului, trebuie să se aplice o zonă de protecție de cel puțin 5 m faţă de locuințe/gospodării..
În timpul tratamentului, se vor utiliza tehnici care reduc cu cel puțin 50% deriva de pulverizare a solutiei de lucru.

După tratament, puneţi în locurile vizibile din jurul câmpului panouri de avertizare Accesul persoanelor neautorizate în zona tratată cu produs fitosanitar este interzisă. Panourile trebuie să rămână până la recoltarea culturii.

Spălați bine mâinile după utilizarea produsului.

Perioada din momentul aplicării preparatului până la data în care în zona de aplicare pot intra oameni şi animale (perioada de profilaxie):
Nu intrați până când lichidul pulverizat nu va fi complet uscat pe suprafața plantelor. Purtați mănuși de protecție și îmbrăcăminte de protecție în timpul inspecției.

MĂSURI DE PRECAUȚIE LEGATE DE PROTECȚIA MEDIULUI NATURAL
Nu contaminați apele cu produsul de protecție a plantelor sau cu ambalajul acestuia. Nu spălați echipamentul lângă apele de suprafață. Evitați contaminarea apelor prin șanțuri de scurgere de la gospodării și drumuri.
Evitați deversarea necorespunzătoare în mediul înconjurător.
În vederea protecției organismelor acvatice este necesară stabilirea zonei de protecţie cu o lățime de 15 m faţă de bazinele și cursurile de apă.
În vederea protecției plantelor care nu constitue ținta produsului, este necesară stabilirea unei zone de protecție cu o lățime de 1 m faţă de terenurile nefolosite în scopuri agricole.

Măsuri în caz de dispersie accidentală: Folosiți echipamentul individual de protecție (îmbrăcăminte de protecție, mănuși, mască de protecție). Nu permiteți că produsul să pătrundă în sistemele de canalizare, apele de suprafață, pânza de apă freatică. În caz de pătrundere în cursurile de apă, sol sau canalizare, informați imediat autoritățile competente. Strângeți materialul împrăștiat folosind materiale absorbante și transferați-l într-un container special, marcat, în scopul îndepărtării ca deșeu de pesticide. Acesta se va elimina conform reglementărilor în vigoare.
Măsuri de combatere a incendiilor: Incendiul poate fi stins cu spumă, produse chimice uscate, dioxid de carbon și dacă este necesar cu ceață de apă. Nu se va folosi jet de apă puternic pentru stingerea incendiului. Se vor lua măsuri pentru prevenirea contaminării apei freatice și a solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. În timpul arderii se pot produce gaze periculoase. A nu se inhala fumul, gazele sau vaporii rezultați. Se va folosi echipament de protecție adecvat și complet, rezistent la substanțe chimice și aparat de respirat autonom. Reziduurile rezultate din incendiu se vor elimina conform reglementărilor locale în vigoare.

CONDIȚIILE DE DEPOZITARE ȘI DE ELIMINARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ A PRODUSULUI FITOSANITAR ȘI A AMBALAJULUI
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Produsul de protecție a plantelor trebuie depozitat:
- în ambalaje originale,
- într-un mod care să prevină contactul cu alimentele, băuturile sau hrana pentru animale, poluarea mediului și accesul terților,
- la temperatura de 0°C – 30°C.

Produsul neutilizat trebuie predat entității autorizate pentru colectarea deșeurilor periculoase.
Produsul neutilizat trebuie transmis entității autorizate să primească deșeuri periculoase.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR
Antidot: nu se cunoaşte, a se aplica tratamentul simptomatic.
În caz de necesitate consultați un medic, trebuie să arătați recipientul și eticheta.
În caz de CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
În caz de INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
În caz de CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
Număr de telefon în caz de urgență medicală: +4 021 599 2300, int. 291, apelabil 24/7,

Centrul de Informare Toxicologică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București.

Transport terestru ADR / RID:

Numărul ONU sau numărul de identificare: UN 3082
În baza dispoziției speciale 375 din capitolul 3.3.1 din ADR, transportul de mărfuri în ambalaje individuale, care nu conţin mai mult de 5 litri de material, produse ca ambalaje unice sau ambalaje interioare de ambalaje combinate, nu este supusă nici unei alte dispoziţii ale ADR, cu condiţia ca ambalajul să îndeplinească cerinţele specificate la punctul 4.1.1.1, 4.1.1.2 și 4.1.1.4 la 4.1.1.8 din ADR.
ADR: Material periculos pentru mediu, lichid, I.N.O. (PROTIOCONAZOL, AZOXYSTROBIN)
RID: Material periculos pentru mediu, lichid, I.N.O. (PROTIOCONAZOL, AZOXYSTROBIN)
Clasapericol în transport: 9/M6
Grupa de ambalare: III
Pericole pentru mediu înconjurător: da
Precauții speciale pentru utilizatori: dispoziții speciale: 274, 335, 375, 601; dispoziții speciale se aplică 5.2.1.8.

În atenţia utilizatorului: Producătorul nu poate verifica modul de păstrare, manipulare şi de utilizare ale produsului şi de aceea îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

Notă: Orice nerespectare a indicaţiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacităţii produsului său chiar la un eşec total. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Institutele sau Staţiunile de profil, Centrele de Protecţia Plantelor sau Oficiile Fitosanitare Judeţene sau reprezentanţii Companiei Innvigo Agro SRL Cluj-Napoca, Str.Barbu Stefănescu Delavrancea, Nr 8-10, Jud Cluj, Tel: 0374.912.123.