RASSEL 100 SC

Erbicid post emergent pentru controlul buruienilor dicotiledonate din culturile de grâu , triticale, orz, secară şi porumb

Certificat de omologare nr: 621PC din 30.06.2020
Conținut în substanță activă: florasulam (CAS nr. 145701-23-1**) –** 100 g/L (9,26%g/g)

Alte ingrediente periculoase care nu sunt substanţe active:
D-glucopiranoză, glicozid alchil C10-16 oligomer;
D-glucopiranoza, glicozid oligomer dodeciloctilc.

Formulare: Suspensie Concentrată (SC)
Categorie de utilizatori: Profesionali
Producător/ Deținătorul omologării:
Innvigo Sp.z.o.o.
Al. Jerozolimskie 178 02-486, Varșovia, Polonia
Distribuitor:
Innvigo Agro SRL
Cluj-Napoca, Str. Madach Imre Nr 64, Jud Cluj
Tel: 0374.912.123; 0364.133.093
Email: office.ro@innvigo.com, www.ro.innvigo.com



Pericol	
H315 H318 H410	Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
EUH208 EUH401	Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.
P264 P280 P273 P305+ P351 +P338 P310 P302+ P352 P362 + P364 P391 P501	Spălați bine mâinile după utilizare. Purtaţi protecţie oculară / protecţie pentru faţă. Evitaţi dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și sunt ușor de îndepărtat. Clătiți în continuare. Contactaţi imediat un CENTRU TOXICOLOGIC/un medic ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. Scoateţi îmbrăcămintea contaminată și spalaţi-o înainte de reutilizare. Colectați scurgerile de produs. Eliminaţi conţinutul la o instalaţie de incinerare aprobată în conformitate cu legislaţia naţională.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul său cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentul de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri
SPe3 Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 20 m până la apele de suprafaţă.
Ambalaje : 250mL; 500mL; 600mL; 800mL; 1L; 2L; 3L; 4L; 5L; 6L;10L; 20L, HDPE
100 mL; 250 mL; COEX/EVOH
500 mL; 1,0 L; 5,0 L; 10,0 L; 20,0 L HDPE/EVOH
120 mL; 323 mL; 550 mL; 1,0 L; 1,1 l; 5,0 L; 5,5 L; 5,85 L; 10,0 L HDPE/PA COEX
275 mL; 500 mL; 574 mL; 1,0 L; HDPE/PA
120 mL; 312 mL; 318 mL; 570 mL; 575 mL; 580 mL; 585 mL; 1,15 L; 1,16 L; 1,17 L; 1,185 L; 1,2 L; 5,88 L; 5,95 L 10,0 L; HDPE/F

188 mL; 564 mL; 510 mL; 1,2 L; 5,85 L; 6,0 L; 11,22 l; 22,0 L; HDPE
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricației
Lot. Nr.:/Data fabricaţiei: Vezi marcajul pe ambalaj

A se utiliza numai pentru scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor şi a mediului înconjurător pot fi evitate numai dacă se vor respecta recomandările din prezenta etichetă. Citiţi întotdeauna eticheta înainte de utilizare.

Eliminarea ambalajelor goale: După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adăugă la soluţia de stropit. Ambalajele de plastic inscripţionate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonaţi la 0800.800.211- număr gratuit sau consultaţi www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare şi al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri.

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE:

RASSEL 100SC este un erbicid selectiv cu acțiune sistemică, formulat ca suspensie concentrată SC, de culoare albă, cu miros caracteristic, destinat pentru aplicare foliară la culturile de cereale.

MOD DE ACTIUNE

În conformitate cu clasificarea HRAC, substanța activă florasulam aparţine grupei 2(anterior B) inhibitori de ALS. Substanța activă florasulam este o triazolopirimidină care acţionează prin inhibarea acetolactat sintetazei (ALS). După aplicare, produsul este absorbit prin frunzele buruienilor şi translocat rapid în întreaga plantă unde inhibă sinteza aminoacizilor cu catenă ramificată și produce perturbări în biosinteza proteinelor. Imediat după tratament, efectul erbicid se observă prin încetarea creșterii și dezvoltarii buruienilor. În condiții optime, adică pe vreme caldă și umedă, efectul erbicid al produsului este rapid vizibil – distrugerea totală a buruienilor are loc după 7-10 zile. În condiții de temperaturi scăzute (aproximativ 4 ^{o}C), distrugerea totală a buruienilor sensibile apare după aproximativ 3 săptămâni. Produsul acţionează eficient asupra buruienilor aflate în faza de dezvoltare de 2-6 frunze.

MOD DE UTILIZARE:

Produsul este destinat utilizării cu pulverizatoare autopropulsate sau cu un pulverizator de câmp tractat sau purtat de tractor.

În România produsul **RASSEL 100SC** este omologat la urmatoarele culturi:

Cultura	**Agentul dăunător**	**Doza (L/ha); momentul aplicării**
Grâu de toamnă	Răcovină (*Stellaria media*), mac de câmp (*Papaver rhoeas*) , mușețel nemirositor (*Matricaria inodora*), lipicioasă (*Galium aparine*), rapiță samulastră(*Brassica napus*), traista-ciobanului (*Capsella bursa pastoris),* pungulița (*Thlaspi arvense*), urzică moartă (*Lamium purpureum*), ventrilică (*Veronica officinalis*).	**50 mL/ha BBCH 13-31**
Grau se toamna, Triticale de toamna, Orz de toamna, Secara de toamna	buchet (*Geranium pusillum*), albăstrea (*Centaurea Cyanus),* răcovină (Stellaria media), mac de câmp (Papaver rhoeas), muşeţel nemirositor(*Matricaria inodora*) lipicioasă (*Galium aparine*), romaniţă de câmp (Arthemis arvensis), muşeţel(*Matricaria chamomilla*)samulastră de rapiţă (Brassica napus) voinicică (*Descurainia sophia*), traista ciobanului (*Capsella bursa pastoris*), punguliţă (*Thlaspi arvense*)	**50 mL/ha BBCH 11-27**

Triticale de toamnă	Răcovină (*Stellaria media*), mac de câmp (*Papaver rhoeas*) , mușețel nemirositor (*Matricaria inodora*), lipicioasă (*Galium aparine*), rapiță samulastră(*Brassica napus*), traista-ciobanului (*Capsella bursa pastoris),* pungulița (*Thlaspi arvense*), urzică moartă (*Lamium purpureum*), ventrilică (*Veronica officinalis*).	**50 mL/ha** **BBCH 24-31**
PORUMB	Buruieni sensibile si mediu sensibile: albăstrea *(Centaurea cyanus)* , romaniță de câmp (*Anthemis Arvensis)* Lipicioasă , *(Galium aparine)* iarba rosie (*Persicaria lapathifolia)*	**50 mL/ha**
	Buruieni sensibile şi mediu sensibile: albăstrea *(Centaurea cyanus)* , romaniță de câmp (*Anthemis Arvensis)* Lipicioasă , *(Galium aparine)* zârnă (*Solanum nigra)*, ardeiul broaștei (*Polygonum persicaria),* hrișcă urcătoare (*Polygonum convolvulus*, iarba rosie (Persicaria lapathifolia),	**50 mL/ha** **+ 100mL/ha** **adjuvant(*Asystent+)***
	buruieni sensibile: albăstrea (*Centaurea cyanus*) , romaniță de câmp (*Anthemis Arvensis*), lipicioasă (*Galium aparine*) iarba rosie (Persicaria lapathifolia). mediu sensibile: zârnă (Solanum nigra), ardeiul broaștei (Polygonum persicaria), hrișcă urcătoare (Polygonum convolvulus), mușețel nemirositor (Matricaria inodora), spanac sălbatic(Chenopodium album)	**50 ml/ha Rassel+ 0,013 kg/ha Skaut 75SG + 100mL/ha Asystent+** **BBCH 11-17**

Skaut 75 SG- tifensulfuron metil 750g/kg

Grâu de toamnă:

Doza maximă /recomandată la o aplicare 50 mL/ha

Momentul aplicării

Produsul se aplică:

- toamna, de la stadiul de dezvoltare a culturii de 1 frunză până la stadiul de 7 fraţi (BBCH 11-27) sau
- primăvara, de la stadiul de dezvoltare a culturii de 3 frunze bazale desfăcute, până la faza primului internod(BBCH 13-31).

Triticale de toamnă

Doza maximă /recomandată la o aplicare 50 mL/ha

Momentul aplicării

Produsul se utilizează:

- toamna, de la stadiul de dezvoltare a culturii de 1 frunză până la stadiul de 7 fraţi (BBCH 11-27) sau
- primăvara, de la infrăţire până la faza primului internod(BBCH 24-31).

Orz de toamnă

Doza maximă /recomandată la o aplicare 50 mL/ha

Momentul aplicării

Produsul se aplică toamna:

- de la stadiul de dezvoltare a culturii de 1 frunză până la stadiul de 7 fraţi (BBCH 11-27)

Secară de toamna
Doza maximă /recomandată la o aplicare 50 mL/ha
Momentul aplicării
Produsul se aplică toamna:
- de la stadiul de 1 frunză până la stadiul de 7 fraţi (BBCH 11-27)
Grau de toamnă, Triticale de toamnă, orz de toamnă, secară de toamnă:
Buruieni rezistente in faza BBCH 13-31: trei frați pătați (Viola arvensis), veronica(Veronica arvensis)
Buruieni rezistente in faza BBCH 11-27: iarba gâştei (*Leonurus cardiaca*) şi sugel (*Lamium purpureum*)

Cantitatea de apă recomandată: 200-300 L/ha.
Tehnica de stropire recomandată: picături medii.
Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 1.

PORUMB

Momentul aplicării: se aplică de la fază primei frunze până la a șapte-a frunză de porumb (BBCH 11-17).

a) Produsul se poate aplica individual:
Doza maximă/recomandată pentru o singură aplicare: 50 mL/ha.

Buruieni cu rezistenţă medie:
mușețel nemirositor (*Matricaria inodora)*, zârnă (*Solanum nigra)*, ardeiul broaștei (*Polygonum persicaria),* hrișcă urcătoare (*Polygonum convolvulus)*

b) utilizarea în amestec cu un adjuvant(*Asystent+):*
Doza maximă/recomandată pentru o singură aplicare:
Rassel 100 SC 50 mL/ha + Asystent+ 100 mL/ha.

Buruieni cu rezistenţă medie: mușețel nemirositor *(Matricaria inodora*)

c) aplicarea în amestec cu Skaut 75SG(tifensulfuron -metil 750 g/kg) şi adjuvant pentru a creşte eficienţa in combaterea lipicioasei(*Galium aparine*):

50 mL/ha Rassel+ 13 g/ka Skaut 75 SG+ 100 mL/ha *Asystent+*

Cantitatea recomandată de apă: 200-300 L/ha.
Tehnica de stropire recomandată: picături medii.
Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 1.

MĂSURI DE PRECAUȚIE, PERIOADE DE AȘTEPTARE ȘI CONDIȚII SPECIALE DE UTILIZARE

Perioada de la ultima aplicare a produsului până la data recoltării culturii (perioada de aşteptare):
Grâul de toamnă, triticale, orz de toamnă, secară, porumb – nu se aplică

1. În condiții meteorologice nefavorabile (de ex. secetă, precipitații abundente imediat după tratament, temperaturi extrem de scăzute sau ridicate, fluctuații mari de temperatură între noapte și zi) pe anumite soiuri de porumb, produsul poate provoca simptome de fitotoxicitate tranzitorii care nu afectează randamentul producţiei.
2. Dacă produsul este utilizat în linii de porumb consangvinizat pe plantații de semințe, se recomandă să efectuați un test pe fiecare cultură pentru a verifica dacă există fenomene de fitotoxicitate.
3. Strategia de management a rezistenţei:

Pentru a reduce la minim riscul de apariţie și dezvoltare a rezistenţei buruienilor la erbicide, acestea trebuie să fie utilizate în conformitate cu Bunele Practici Agricole:

– urmați cu strictețe instrucțiunile cuprinse pe eticheta produsului fitosanitar,

- utilizați produsul la doza recomandată, în perioada recomandată, care asigură cel mai bun control de distrugere a buruienilor,
- ajustați selecția erbicidului și efectuarea tratamentului în funcţie de buruienile predominante (eventual potențiale), luând în considerare speciile dominante și pragurile de pericol,
- utilizaţi rotaţia erbicidelor (substanțelor active) cu un mecanism diferit de acţiune,
- utilizaţi un amestec de erbicide (substanțe active) cu un mecanism diferit de acţiune,
- utilizați în rotaţie și/sau amestecuri erbicide care acționează asupra mai multor procese de viaţă a buruienilor (cu mecanisme diferite de acţiune),
- utilizați un erbicid cu un anumit mecanism de acțiune o singură dată în timpul perioadei de vegetație a culturii,
- adaptaţi tratamentele la condițiile de pe câmp, în special țineți cont de tipul și cantitatea buruienilor,
- utilizați diverse metode de combatere a buruienilor inclusiv rotația culturilor etc.,
- utilizați semințe certificate,
- curățați mașinile agricole pentru a împiedica transferul materialului de înfrățire în alte locuri,

4. Produsul <u>nu se va utiliza:</u>

- pe plantele umede, bolnave și deteriorate,
- imediat după o perioadă rece de lungă durată pe plantele a căror creştere a fost stagnată de temperaturile joase; tratamentul poate fi efectuat după reluarea creşterii intense a plantei de porumb,
- în cereale intercalate cu plate leguminoase,
- la temperaturi ale aerului sub 4 °C și peste 25 °C,
- în caz de secetă excesivă,
- după ger de noapte şi în cazul în care se prevede ger de noapte

5. În timpul aplicării produsului evitaţi:

- dispersia soluţiei de stropire pe culturi limitrofe,
- suprapunerea soluţiei de stropit pe benzile de aplicare și la capetele de rând.

ROTAŢIA CULTURILOR

Produsul se descompune în sol în perioada de vegetaţie, fără a pune în pericol culturile succesive. În cazul desfiinţării timpurii a culturii tratate cu acest produs (ca urmare a deteriorării culturii din cauza înghețului, boli sau dăunători), se pot cultiva pe acest teren toate tipurile de cereale de primăvară și porumb după pregătirea terenului pentru semănare.

PREGĂTIREA SOLUŢIEI PENTRU TRATAMENT

Soluţia pentru tratament se va pregăti doar înainte de utilizare.

Înainte de prepararea soluţiei stabiliţi exact volumul de apă împreună cu cantitatea necesară de produs. La umplerea rezervorului maşinii de stropit procedaţi în conformitate cu instrucţiunea de lucru a producătorului echipamentului de tratament. În cazul lipsei instrucţiunii, cantitatea măsurată de produs trebuie adăugată în rezervorul maşinii de stropit umplut parţial cu apă şi cu agitatorul pornit.

Ambalajul golit trebuie clătit de trei ori cu apă iar apa de clătire adăugată în rezervorul maşinii de stropit și apoi completată cu apă până la cantitatea necesară, sub continuă agitare. Dacă mașinii de stropit nu este echipată cu un amestecător hidraulic, după adăugarea produsului se va amesteca mecanic lichidul din rezervor.

În cazul întreruperilor de stropire, înainte de reluarea lucrului, lichidul din rezervor trebuie bine omogenizat.

SPĂLAREA ECHIPAMENTELOR SI ELIMINAREA REZIDUURILOR

Soluţia pentru tratament rămasă neutilizată și apa folosită pentru spălarea rezervorului mașinii de stropit se recomandă a fi:

- utilizate, după o diluare prealabilă, pe suprafața pe care a fost efectuat tratamentul, dacă acest lucru este posibil, sau
- eliminate folosind o soluție tehnică pentru a asigura degradarea biologică a substanțelor active din produsele fitosanitare, sau

- eliminat în alt mod, în conformitate cu prevederile privind deșeurile.

După lucru, echipamentele folosite se spală foarte bine.
Datorită sensibilităţii foarte ridicate a anumitor plante cultivate chiar şi la cantităţile neglijabile ale produsului, este foarte importantă spălarea temeinică a maşinii de stropit după tratament, în special înainte de utilizare în alte culturi decât cele recomandate, în conformitate cu modul prezentat mai jos:

- goliţi rezervorul, apoi clătiţi toate componentele maşinii de stropit şi goliţi din nou,
- umpleţi rezervorul cu apă adăugând unul dintre preparate recomandate pentru spălarea maşinilor de stropit şi clătiţi cel puţin 10 minute cu agitatorul pornit,
- demontaţi componentele pulverizatorului, spălaţi-le şi clătiţi-le separat în soluţia de spălat pentru maşinile de stropit,
- reclătiţi rezervorul şi toate componentele maşinii de spălat cu apă curată.

ATENȚIE
Soluţia de tratare care nu au fost neutralizată corespunzător și a rămas în pulverizator poate cauza distrugerea culturilor sensibile la acest produs.

MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU UTILIZATORII PRODUSULUI, LUCRĂTORI DE CÂMP ȘI TERȚI

Înainte de utilizarea produsului trebuie informate despre acest fapt toate părţile interesate care pot fi expuse la dispersia soluţiei de stropire şi care au solicitat asemenea informaţii.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.
Purtați mănuși de protecție, protecție ochi sau față și îmbrăcăminte de lucru în timpul preparării soluţiei de lucru și în timpul tratamentului.
Utilizați mănuși de protecție și îmbrăcăminte de protecție când intrați în zona tratată.
Perioada din momentul aplicării produsului până la data în care în zona în care a fost aplicat produsul pot intra oameni şi animale : Nu intrați până când soluţia pulverizată nu este complet uscată pe suprafața plantelor.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Antidot: lipsă, a se aplica tratamentul simptomatic.
Dacă nu vă simțiți bine contactați un centru de informare toxicologică sau un medic.
În caz de necesitate consultaţi un medic, trebuie să arătaţi recipientul sau eticheta.
În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și sunt ușor de îndepărtat. Clătiți în continuare. Contactaţi imediat un centru toxicologic/un medic.
În caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă.
Număr de telefon în caz de urgenţă medicală: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/ interior 235 (Luni - Vineri 8:00 – 15:00); Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 Bucureşti.

MĂSURI DE PRECAUȚIE LEGATE DE PROTECȚIA MEDIULUI

Nu contaminaţi apele cu produsul de uz fitosanitar sau cu ambalajul acestuia.
Nu spălaţi echipamentul în apropierea apelor de suprafaţă.
Evitaţi contaminarea apelor prin utilizarea improprie a şanţurilor de scurgere de la gospodării şi drumuri.
Evitați deversarea necorespunzătoare în mediul înconjurător.
În vederea protecţiei organismelor acvatice este necesară stabilirea zonei de protecţie cu o lăţime de 15 m de la bazinele şi cursurile de apă.
În vederea protecţiei plantelor și artropodelor care nu constituie ţinta acţionării produsului, este necesară delimitarea unei zone de protecţie neutilizate în agricultură cu o lăţime de:

- 5 m sau

- 1 m prin utilizarea simultană a tehnicilor de reducere a driftului de lucru în timpul tratamentului cu 75%.

Măsuri în caz de dispersie accidentală: Folosiți echipamentul individual de protecție (îmbrăcăminte de protecție, mănuși, mască de protecție). Nu permiteţi că produsul să pătrundă în sistemele de canalizare, apele de suprafaţă, pânza de apă freatică. În caz de pătrundere în cursurile de apă, sol sau canalizare, informaţi imediat autorităţile competente. Strângeţi materialul împrăştiat folosind materiale absorbante şi transferați-l într-un container special, marcat, în scopul îndepărtării ca deşeu de pesticide. Acesta se va elimina conform reglementărilor în vigoare.

CONDIȚIILE DE DEPOZITARE ȘI DE ELIMINARE ÎN SIGURANȚĂ ALE PRODUSULUI FITOSANITAR ȘI AMBALAJULUI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Produsul de protecție a plantelor trebuie depozitat:

- în ambalaje originale,
- într-un mod care să prevină contactul cu alimentele, băuturile sau hrana pentru animale, poluarea mediului și accesul terților,
- la o temperatura de 0 ^{o}C–30 ^{o}C.

Se interzice utilizarea ambalajelor produselor de protecţie a plantelor golite pentru alte scopuri.

Produsul neutilizat trebuie transmis entității autorizate să primească deșeuri periculoase.

Ambalajul golit de preparat trebuie returnat vânzătorului de produse fitosanitare periculoase.

Măsuri de combatere a incendiilor: Incendiul poate fi stins cu spumă, produse chimice uscate, dioxid de carbon și dacă este necesar cu ceaţă de apă. Nu se va folosi jet de apă puternic pentru stingerea incendiului. Se vor lua măsuri pentru prevenirea contaminării apei freatice şi a solului cu substanţele folosite la stingerea incendiului. În timpul arderii se pot produce gaze periculoase. A nu se inhala fumul, gazele sau vaporii rezultați. Se va folosi echipament de protecţie adecvat şi complet, rezistent la substanţe chimice şi aparat de respirat autonom. Reziduurile rezultate din incendiu se vor elimina conform reglementărilor locale în vigoare.

Condiţii de depozitare şi transport: Produsul se va depozita numai în ambalajul original, în încăperi uscate, ventilate, destinate în exclusivitate pesticidelor, fără acţiunea directă a soarelui şi a căldurii, departe de orice surse de căldură. A nu se depozita în apropierea alimentelor, băuturilor şi hranei animalelor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a personalului neautorizat şi în zonele de acces ale animalelor. Transportul se va efectua ferit de intemperii şi căldură. Pe timpul manipulării, transportului şi al depozitării se vor lua obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, prevăzute de legile în vigoare. Temperatura de depozitare este peste 0°C şi cel mult 30 °C.

Informaţii privind transportul:

Număr UN (număr ONU): UN 3082

ADR: MATERIAL PERICULOS PENTRU MEDIU, LICHID, I.N.O.(FLORASULAM)

RID: MATERIAL PERICULOS PENTRU MEDIU, LICHID, I.N.O.(FLORASULAM)

Nr. UN : 3082
Grupa ambalare : III
Clasa de pericol : 9/M6

În atenţia utilizatorului: Producătorul nu poate verifica modul de păstrare, manipulare şi de utilizare al produsului şi de aceea îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

Notă: Orice nerespectare a indicaţiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacităţii produsului sau chiar la un eşec total. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Institutele sau Staţiunile de profil, Centrele de Protecţia Plantelor sau Serviciile de Carantină Fitosanitară sau reprezentanţii Companiei Innvigo Agro SRL Cluj-Napoca, Str. Madach Imre Nr 64, Jud Cluj, Tel: 0374.912.123; 0364.133.093